

# BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC TIÊM PHÒNG VẮC XIN UỐN VÁN - BẠCH HẦU (Td)

Kính thưa các thầy giáo, cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến!

## 1. Vắc xin Td là vắc xin phòng bệnh gì?

Vắc xin Td hay còn gọi là vắc xin Uốn ván - Bạch hầu. Vắc xin này kết hợp từ giải độc tố Uốn ván và giải độc tố Bạch hầu tinh chế và hấp phụ bằng Aluminium phosphate. Vắc xin được chỉ định để phòng bạch hầu và uốn ván cho người lớn và trẻ em từ 7 tuổi trở lên.

## 2. Không tiêm vắc xin Td có nguy hiểm không?

### \* Bệnh Bạch hầu:

- Là bệnh truyền nhiễm do trực khuẩn bạch hầu gây ra. Bệnh gây tổn thương chủ yếu ở vùng mũi, họng,...

- Bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp hoặc lây gián tiếp qua đồ dùng, quần áo, thức ăn... có chứa mầm bệnh mầm bệnh.

- Bệnh gây ra những biến chứng nguy hiểm và có thể gây tử vong cho trẻ vì trụ tim mạch.

### \* Bệnh Uốn ván:

- Là bệnh truyền nhiễm cấp tính do trực khuẩn uốn ván gây ra.

- Bệnh lây chủ yếu qua da và niêm mạc tổn thương.

- Trẻ dưới 5 tuổi và người lớn tuổi thường bị bệnh nặng với tỷ lệ tử vong cao, khoảng từ 30-50%; trẻ sơ sinh có tỷ lệ tử vong rất cao.

*Vì vậy tiêm vắc xin Uốn ván - Bạch hầu là phương pháp phòng ngừa bệnh có hiệu quả nhất.*

## 3. Chỉ định và chống chỉ định tiêm vắc xin Td

\* **Vắc xin Td chỉ định tiêm trong trường hợp:** Trẻ từ 7 tuổi trở lên và người lớn khi muốn phòng bệnh Bạch hầu và Uốn ván.

### \* **Vắc xin Td chống chỉ định tiêm trong trường hợp:**

- Dị ứng nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng sau khi tiêm một liều của bất kỳ loại vắc xin nào có chứa bạch hầu hoặc uốn ván thì không nên tiêm vắc xin Td.

- Không tiêm vắc xin Td khi bị nhiễm trùng cấp tính mà phải đợi đến đi hết nhiễm trùng.

- Không tiêm đường bắp cho người bị rối loạn chảy máu hoặc giảm tiểu cầu.

## 4. Liều tiêm và tác dụng phụ của vắc xin Td

### \* **Liều tiêm**

- Liều tiêm vắc xin bạch hầu uốn ván là 0,5ml:

- Đối với trẻ 7 tuổi trở lên mà trước đó đã được tiêm phòng cơ bản, đủ liều phòng bạch hầu và uốn ván thì tiêm nhắc lại 1 liều vào lứa tuổi thứ 7, 10 năm tiêm phòng lại 1 lần để củng cố miễn dịch.

- Với trẻ từ 7 tuổi trở lên nhưng trước đó chưa được tiêm vắc xin phòng uốn ván, bạch hầu, thì cần tiêm 3 mũi. Mũi thứ 2 phải cách mũi thứ nhất 1 tháng. Mũi 3 cách mũi 2 khoảng 6 tháng. Sau đó nếu cần thiết thì cũng 10 năm tiêm nhắc lại 1 lần.

**\* Tác dụng phụ của vắc xin Td**

Bất cứ loại vắc xin nào cũng đều có nguy cơ xảy ra các tác dụng phụ. Đối với vắc xin Td, các tác dụng phụ có thể xảy ra như:

- Đau, đỏ và sưng tấy tại chỗ tiêm
- Có thể xuất hiện triệu chứng nhức đầu, sốt nhẹ, mệt mỏi
- Triệu chứng hiếm gặp là đau nặng, chảy máu, áp xe, viêm dây thần kinh ngoại biên.

Trên đây tôi đã trình bày xong nội dung bài tuyên truyền về phòng chống bệnh bạch hầu, uốn ván.

Cảm ơn các thầy, cô và các em học sinh đã lắng nghe!

Đông Thành, ngày 31 tháng 10 năm 2025.

**LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH**

**TRẠM XÁ PHƯỜNG**

**Y TẾ HỌC ĐƯỜNG**



*[Handwritten signature]*

**Vũ Thị Thúy Hà**



*[Handwritten signature]*

**Đặng Văn Thanh**

*[Handwritten signature]*

**Lê Thị Bích Luyến**